

Foglio illustrativo: informazioni per l'utente

Lamictal 2 mg compresse masticabili/dispersibili
Lamictal 5 mg compresse masticabili/dispersibili
Lamictal 25 mg compresse masticabili/dispersibili
Lamictal 50 mg compresse masticabili/dispersibili
Lamictal 100 mg compresse masticabili/dispersibili
Lamictal 200 mg compresse masticabili/dispersibili

Lamotrigina

(...)

2. Cosa deve sapere prima di prendere Lamictal

(...)

Pensieri di farsi del male o di suicidio

I medicinali antiepilettici sono utilizzati per il trattamento di varie condizioni, inclusi l'epilessia ed il disturbo bipolare. Le persone con disturbo bipolare possono talvolta avere pensieri di farsi del male o di commettere suicidio. Se lei ha un disturbo bipolare è più probabile che lei abbia questi pensieri:

- quando inizia il trattamento per la prima volta
- se ha avuto in precedenza pensieri di farsi del male o relativi al suicidio
- se ha meno di 25 anni.

Se lei ha pensieri o esperienze che la disturbano, o se lei nota di sentirsi peggio o di sviluppare nuovi sintomi mentre sta prendendo Lamictal:

➔ **contatti il medico il prima possibile o vada al più vicino ospedale per avere aiuto.**

Può trovare utile dire a un familiare, a chi la assiste o a un buon amico che è possibile che lei diventi depresso o abbia importanti cambiamenti d'umore e chiedere loro di leggere questo foglio. Può chiedere loro di dirle se sono preoccupati per la sua depressione o per altri cambiamenti del suo comportamento.

Un piccolo numero di persone in corso di trattamento con antiepilettici, come Lamictal, ha anche avuto pensieri di farsi del male o di suicidarsi. Se in qualsiasi momento le venissero questi pensieri, contatti immediatamente il medico.

(...)