

**Pantoprazolo Sandoz GmbH 40 mg polvere per soluzione iniettabile**  
Medicinale equivalente

**2. Cosa deve sapere prima di usare Pantoprazolo Sandoz GmbH polvere per soluzione iniettabile**

**Informi immediatamente il medico** se nota l'insorgenza di uno qualsiasi dei seguenti sintomi:

- perdita di peso non intenzionale
- ripetuti episodi di vomito
- difficoltà di deglutizione
- presenza di sangue nel vomito
- pallore e debolezza (anemia)
- presenza di sangue nelle feci
- diarrea grave e/o persistente, poiché Pantoprazolo Sandoz GmbH 40 mg polvere per soluzione iniettabile è stato associato a un lieve aumento della diarrea infettiva-

• si rivolga al medico se ha mai avuto una reazione cutanea dopo il trattamento con un medicinale simile a Pantoprazolo Sandoz GmbH che riduce l'acidità gastrica.

Se nota la comparsa di un eritema cutaneo, soprattutto nelle zone esposte ai raggi solari, si rivolga al medico il prima possibile, poiché potrebbe essere necessario interrompere la terapia con Pantoprazolo Sandoz GmbH. Si ricordi di riferire anche eventuali altri effetti indesiderati quali dolore alle articolazioni.

Il medico può decidere di prescrivere alcune analisi volte a escludere un disturbo maligno, perché pantoprazolo allevia anche i sintomi del tumore e potrebbe ritardarne la diagnosi. Se i suoi sintomi continuano nonostante il trattamento, saranno necessarie ulteriori indagini.

**4. Possibili effetti indesiderati**

**Altri possibili effetti indesiderati**

**Frequenza non nota** (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili)

- allucinazioni, confusione (specialmente nei pazienti con un'anamnesi di questi sintomi), sensazione di "aghi e spilli" (parestesia); spasmo muscolare; diminuzione del livello di sodio nel sangue-, eritema, possibili dolori articolari.

Se assume Pantoprazolo Sandoz GmbH per più di tre mesi, i livelli ematici di magnesio possono diminuire. Bassi livelli di magnesio possono manifestarsi con affaticamento, contrazioni muscolari involontarie, disorientamento, convulsioni, capogiro, aumento della frequenza cardiaca. Se ha qualcuno di questi sintomi consulti immediatamente il medico. Bassi livelli di magnesio possono anche comportare una riduzione dei livelli ematici di potassio o calcio. Il medico dovrebbe decidere se controllare periodicamente i livelli di magnesio nel sangue.

**6. Contenuto della confezione e altre informazioni**

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il ~~5 Agosto 2014~~ Aprile 2016