

Foglio illustrativo: informazioni per l'utente

Diflucan 50 mg capsule rigide
Diflucan 100 mg capsule rigide
Diflucan 150 mg capsule rigide
Diflucan 200 mg capsule rigide
fluconazolo

2. Cosa deve sapere prima di prendere Diflucan

Non prenda Diflucan

- se prende eritromicina (antibiotico utilizzato per il trattamento di infezioni batteriche)
- se prende amiodarone (utilizzato per il trattamento delle "aritmie", battiti del cuore irregolari)

Avvertenze e precauzioni

- se compaiono reazioni cutanee gravi (prurito, arrossamento della pelle o difficoltà nella respirazione).
- se compaiono segni di 'insufficienza surrenale', per cui le ghiandole surrenali non producono quantità adeguate di determinati ormoni steroidei come il cortisolo (affaticamento cronico o duraturo, debolezza muscolare, perdita di appetito, perdita di peso, dolore addominale)

Altri medicinali e Diflucan

Esistono alcuni medicinali che possono interagire con Diflucan. Informi il medico se sta assumendo qualcuno dei seguenti medicinali:

- ivacaftor (utilizzato per il trattamento della fibrosi cistica)
- amiodarone (utilizzato per il trattamento delle "aritmie", battiti del cuore irregolari)

Gravidanza, allattamento e fertilità

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno, chieda consiglio al medico o al farmacista prima di prendere questo medicinale.

Non deve assumere Diflucan durante la gravidanza a meno che non sia stato il medico a prescriverglielo.

Può continuare ad allattare dopo aver assunto una dose singola di Diflucan fino a 200 mg. Non deve allattare se sta assumendo dosi ripetute di Diflucan.

Uso nei bambini di età da 0 a 4 settimane

Uso nei bambini di età da 3 a 4 settimane:

Lo stesso dosaggio sopra descritto ma somministrato una volta ogni 2 giorni. La dose massima è di 12 mg per kg di peso corporeo ogni 48 ore.

4. Possibili effetti indesiderati

Diflucan può avere effetti sul fegato. Tra i sintomi dei problemi al fegato ci sono:

- stanchezza
- perdita di appetito
- vomito
- ingiallimento della pelle e della parte bianca degli occhi (ittero)

Diflucan può avere effetti sulle ghiandole surrenali e sui livelli degli ormoni steroidei prodotti. Tra i sintomi dei problemi alle ghiandole surrenali ci sono:

- stanchezza
- debolezza muscolare
- perdita di appetito
- perdita di peso
- dolore addominale

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico, al farmacista o all'infermiere. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione

all'indirizzo: <http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili>.

Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

Questo medicinale è autorizzato negli Stati Membri dello Spazio Economico Europeo con le seguenti denominazioni:

| | |
|--|---|
| Belgio, Bulgaria, Danimarca, Finlandia, Irlanda, Islanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi , Polonia, Portogallo, Regno Unito, Svezia | Diflucan |
| Paesi Bassi | Diflucan 50 mg, capsules, hard Diflucan 100 mg, capsules, hard Diflucan 150 mg, capsules, hard Diflucan 200 mg, capsules, hard |

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il ~~04/2015~~[04/2016](#)