

Foglio illustrativo: informazioni per l'utente

Reminyl 8 mg capsule rigide a rilascio prolungato
Reminyl 16 mg capsule rigide a rilascio prolungato
Reminyl 24 mg capsule rigide a rilascio prolungato
galantamina

.....

2. Cosa deve sapere prima di prendere Reminyl

.....

Effetti indesiderati gravi

Reminyl può causare [reazioni cutanee gravi](#), problemi cardiaci e convulsioni (crisi epilettiche). È necessario che sia consapevole di questi effetti collaterali mentre si sta assumendo Reminyl. Vedere "Attenzione agli effetti collaterali gravi" nel paragrafo 4.

.....

4 Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati, sebbene non tutte le persone li manifestino.

Attenzione agli effetti indesiderati gravi

Smetta di ~~assumere~~[prendere](#) Reminyl e consulti immediatamente il medico [o vada al pronto soccorso più vicino](#) se nota uno ~~qualsiasi~~ dei seguenti effetti:-.

[Reazioni cutanee, tra cui:](#)

- [grave eruzione cutanea con vesciche e desquamazione della pelle, soprattutto intorno alla bocca, naso, occhi e genitali \(sindrome di Stevens-Johnson\);](#)
 - [arrossamento cutaneo coperto da piccole vesciche piene di pus che possono diffondersi su tutto il corpo, a volte con febbre \(pustolosi esantematica acuta generalizzata\);](#)
 - [eruzione cutanea che può coprirsi di vesciche, con macchie che sembrano piccoli bersagli.](#)
- [Queste reazioni cutanee sono rare nelle persone che prendono Reminyl \(possono interessare fino a 1 persona su 1.000\).](#)

• **Problemi ~~di~~ cuore**, inclusi cambiamenti del battito cardiaco (come battito lento o battiti aggiuntivi) o palpitazioni (il cuore sembra battere veloce o in modo irregolare). I problemi ~~di~~ cuore si possono manifestare come un tracciato anomalo su un 'elettrocardiogramma' (ECG) e può essere comune nelle persone che assumono Reminyl (può interessare fino a 1 persona su 10).

• **Convulsioni (crisi epilettiche)**. Queste non sono comuni in persone che prendono Reminyl (può interessare fino a 1 persona su 100).

[Interrompa l'assunzione di Reminyl e chiedi immediatamente aiuto se nota uno qualsiasi degli effetti indesiderati di cui sopra.](#)

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il: ~~Ottobre 2015~~ [Febbraio 2016](#)