

~~M~~Metadone cloridrato ~~o~~ medicinale equivalente

Altri medicinali e METADONE CLORIDRATO MOLTENI

Il metadone può influenzare il modo in cui alcuni medicinali agiscono e alcuni medicinali possono interferire con il funzionamento di metadone.

Il suo medico potrebbe decidere di aumentare la dose di metadone, per evitare crisi di astinenza, se sta assumendo altri medicinali quali:

- medicinali per l'epilessia come barbiturici (**ad es. fenobarbital**), carbamazepina, fenitoina, ~~fenobarbital~~;
- medicinali per il trattamento dell'AIDS come nevirapina ed efavirenz, **nonché amprenavir, nelfinavir, abacavir, associazioni lopinavir/ritonavir e ritonavir/saquinavir**;
-
- **antinfiammatori (ad es. desametasone);**
- **preparati a base di erba di San Giovanni (hypericum perforatum), usati per ansia e depressione;**
- ~~medicinali usati per problemi gastrici come la cimetidina;~~ **diuretici (ad es. spironolattone);**
-

Il suo medico potrebbe decidere di diminuire la dose di metadone se sta assumendo ~~altri medicinali quali:~~

-
-
- **altri medicinali per problemi cardiaci e di pressione (calcio antagonisti);**
- **immunosoppressori (ciclosporina);**
- **medicinali contro i batteri come la claritromicina, l'eritromicina, la telitromicina e la ciprofloxacina;**
-
- **medicinali usati per problemi gastrici come la cimetidina;**
~~medicinali contro i batteri come la claritromicina e l'eritromicina;~~
- **antidepressivi come nefazodone ed inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina come fluvoxamina e fluoxetina;**
- **medicinali usati per il trattamento delle infezioni da funghi, quali itraconazolo, ~~ketoconazolo~~ e fluconazolo.**

Il metadone può interferire sull'attività di altri medicinali, informi il medico se sta assumendo:

-
- **medicinali che influenzano la conduzione cardiaca o ~~farmaci~~ che ~~possano~~ **possono** influenzare la concentrazione di ~~s~~ **ali nel sangue;****
- **medicinali per il controllo del ritmo del cuore come sotalolo, amiodarone e flecainide, antidepressivi come paroxetina e sertralina e alcuni antibiotici (eritromicina e claritromicina), perché possono causare problemi di cuore;**
-
- ~~medicinali usati nella terapia del dolore~~ **analgesici oppioidi**, come butorfanolo, nalbufina, pentazocina;
- **medicinali che esercitano un'azione depressiva sul SNC come ~~altri~~ analgesici, tranquillanti;**
- **medicinali usati nel trattamento della diarrea come difenossilato ~~e~~ loperamide ~~e~~;**
- **medicinali a base di octreotide usati per il trattamento di alcuni tumori;**
-
- **medicinali usati per la depressione, come gli inibitori della monoaminossidasi (MAO) e la desipramina.**

Istruzioni per le confezioni munite di chiusura a prova di bambino

~~Le confezioni sono munite di chiusura a prova di bambino.~~

Per aprire: premere e contemporaneamente ruotare in senso antiorario.

Per chiudere: premere e contemporaneamente ruotare in senso orario.

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il: ~~aprile 2016~~ settembre 2015