

## Foglio illustrativo: informazioni per il paziente

### UGUROL 500 mg/5 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso, per uso orale e locale

Acido tranexamico

#### 1. Come prendere UGUROL

Prenda questo medicinale seguendo esattamente le istruzioni del medico.  
Se ha dubbi consulti il medico o l'infermiere.

#### Uso negli adulti per via endovenosa

Ugurol soluzione è somministrato con una lenta iniezione in vena. Il medico deciderà la dose adatta a lei e per quanto tempo dovrà prenderla.

#### Uso negli adulti per via orale

La somministrazione per via orale è soprattutto indicata:

- nelle manifestazioni emorragiche insorgenti in medicina interna, in otorinolaringoiatria ed in odontoiatria; per la preparazione di interventi chirurgici in cui si presume possano insorgere emorragie da attivazione plasminica;
- nelle ipermenorree;
- nei gemizi in ginecologia, ~~nelle cistiti e nelle proctiti emorragiche a seguito di terapia radiante per carcinoma genitale;~~
- per il mantenimento di terapie iniziate per via endovenosa allo scopo di impedire recidive dell'emorragia.

#### ~~Uso negli adulti per via endovenosa~~

~~UGUROL soluzione è somministrato con una lenta iniezione in vena. Il medico deciderà la dose adatta a lei e per quanto tempo dovrà prenderla.~~

#### Uso nei bambini

Se UGUROL 500 mg/5ml soluzione è somministrato a un bambino a partire da un anno, la dose sarà calcolata in base al peso del bambino. Il medico deciderà la dose adatta al bambino e per quanto tempo dovrà prenderla.

#### **Modo di somministrazione**

~~UGUROL~~ Ugurol 500 mg/5ml soluzione deve essere somministrato lentamente in vena.

~~UGUROL~~ Ugurol 500 mg/5ml soluzione non deve essere iniettato in un muscolo.

Per la somministrazione orale o l'applicazione locale di Ugurol 500 mg/5ml si vedano i paragrafi "Uso negli adulti per via orale" e "Uso negli adulti per applicazione locale".

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato nel ~~Dicembre 2013~~  
Aprile 2016