

Estratto del Foglio illustrativo: informazioni per il paziente

Lasitone 25 mg + 37 mg capsule rigide

furosemide, spironolattone

../..

Avvertenze e precauzioni

../..

Faccia particolare attenzione e chiedi consiglio al medico prima di prendere Lasitone se:

- ../..

- se è anziano, se sta prendendo altri medicinali che possono causare un abbassamento della pressione del sangue e se soffre di altre malattie che comportano rischi di abbassamento della pressione del sangue;

../..

Altri medicinali e Lasitone

../...

In particolare è sconsigliato assumere Lasitone con:

- ../..

- levotiroxina (un medicinale utilizzato per stimolare la tiroide); alte dosi di furosemide possono portare ad una complessiva diminuzione dell'ormone della tiroide.

../..

4. Possibili effetti indesiderati

../..

Gli effetti indesiderati che possono manifestarsi sono i seguenti:

- ../..

Non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili)

- ../..

- alterazione della funzionalità dei suoi reni (insufficienza renale), specialmente se soffre di diminuita circolazione del sangue a livello dei reni;

- ../..

- sviluppo della mammella nell'uomo (effetto reversibile -che dipende dalla dose e dalla durata della terapia);

- ../..

- infiammazione del fegato (epatite);

- mal di testa (cefalea);

- difficoltà nell'eseguire i movimenti (atassia);

- perdita della sensibilità e della prontezza dei riflessi (torpore);

- confusione mentale e sonnolenza (letargia);

- irregolarità del ciclo mestruale, che dipende dalla dose, inclusa assenza del ciclo mestruale (amenorrea);

- capogiri, svenimenti e perdita della coscienza (dovuti a ipotensione sintomatica);

- grave danno del muscolo scheletrico e rilascio nel sangue delle sostanze contenute nei muscoli (rabbdomiolisi), in genere nel contesto di una grave carenza di potassio nel sangue.

../..

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il ~~Luglio 2015~~ Aprile 2016