

Foglio illustrativo: Informazioni per l'utente

Augmentin bambini 400 mg/57 mg/5 ml polvere per sospensione orale Amoxicillina/acido clavulanico

[...]

3. Come usare Augmentin

[...]

Bambini di peso inferiore a 40 kg

[...]

- Deve dotarsi di un cucchiaino dosatore di plastica o di un misurino dosatore o di una siringa dosatrice. [Istruzioni su come utilizzare la siringa dosatrice sono disponibili alla fine del foglietto illustrativo.](#) Li userà per dare al suo neonato o bambino la giusta dose.

[...]

Istruzioni per la ricostituzione

Prima dell'uso, verificare che il sigillo sul tappo sia integro. Agitare il flacone per sciogliere la polvere. Aggiungere il volume di acqua (come indicato sotto) capovolgere e agitare bene.

~~In alternativa, agitare il flacone per sciogliere la polvere, e riempire il flacone con acqua appena al di sotto del livello riportato sull'etichetta del flacone, capovolgere e agitare bene. Poi riempire con acqua esattamente al livello, capovolgere e di nuovo agitare bene.~~

<u>Dosaggio</u>	<u>Volume di acqua da aggiungere per la ricostituzione (ml)</u>	<u>Volume finale di sospensione orale ricostituita (ml)</u>
400 mg/57 mg/5 ml	32	35
	64	70
	127	140

~~[In alternativa, agitare il flacone per sciogliere la polvere, e riempire il flacone con acqua appena al di sotto del livello riportato sull'etichetta del flacone, capovolgere e agitare bene. Poi riempire con acqua esattamente al livello, capovolgere e di nuovo agitare bene.](#)~~

~~Agitare bene il flacone prima di assumere ciascuna dose.~~

Istruzioni per l'uso della siringa

Per somministrare Augmentin viene fornita una siringa

La siringa deve essere usata solo per la somministrazione di Augmentin e non deve essere usata per somministrare altri medicinali, perchè le marcature sono specifiche per questo prodotto. La siringa viene fornita con un adattatore che permette l'attacco al flacone.

La dose sulla siringa per uso orale è indicata in millilitri(ml). La dose da dare al suo bambino deve essere quella raccomandata dal suo medico.

Controllare che il sigillo di chiusura sia integro prima del primo utilizzo.

Verificare la pulizia della siringa e dell'adattatore prima dell'uso, sciacquare con acqua pulita, se richiesto.

1. Capovolgere e agitare il flacone per sciogliere la polvere.

1. Agitare bene il flacone prima di ogni somministrazione.

Aggiungere acqua nel flacone fino ad arrivare appena sotto la tacca. Chiudere, capovolgere e agitare bene, quindi aggiungere ancora acqua fino ad arrivare esattamente alla tacca. Capovolgere ed agitare bene.

In alternativa

Riempire il flacone con 32 ml di acqua (35 ml)

Riempire il flacone con 64 ml di acqua (70 ml)

Riempire il flacone con 127 ml di acqua (140 ml)

Capovolgere ed agitare bene.

2. Aprire il flacone.




3. Togliere l'adattatore dalla siringa. Tenere il flacone saldamente e inserire l'adattatore nel collo del flacone (l'adattatore dovrebbe rimanere fermo).

Inserire la siringa nell'adattatore assicurandosi che sia ben posizionato.



4. Capovolgere la bottiglia-il flacone mantenendo la siringa in posizione ed estrarre la dose richiesta, come indicato dal medico.




5. Rimettere il flacone in posizione verticale e togliere la siringa.

6. Per somministrare la dose, inserire con cura la punta della siringa nella bocca e spingere lentamente lo stantuffo verso il basso (ripetere i punti 4, 5 e 6 se è necessaria più di una siringa per somministrare la dose).



7. Risciacquare abbondantemente la siringa con acqua pulita. Fare asciugare completamente la siringa prima dell'uso successivo.



8. Richiudere il flacone con il tappo.



Conservare in frigorifero ed agitare sempre prima dell'uso.
Una volta ricostituita, la sospensione deve essere usata entro 7 giorni.