

Eliquis 5 mg compresse rivestite con film

Foglio illustrativo: informazioni per l'utente

Eliquis 5 mg compresse rivestite con film

Apixaban

~~▼ Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Ciò permetterà la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Lei può contribuire segnalando qualsiasi effetto indesiderato riscontrato durante l'assunzione di questo medicinale. Vedere la fine del paragrafo 4 per le informazioni su come segnalare gli effetti indesiderati.~~

Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perchè contiene importanti informazioni per lei.

(...)

2 Cosa deve sapere prima di prendere Eliquis

(...)

Altri medicinali ed Eliquis

(...)

- **antinfiammatori** o **antidolorifici** (es. ~~acido acetilsalicilico~~ ~~aspirina~~ o naprossene). In maniera particolare se ha più di 75 anni di età e sta assumendo ~~acido acetilsalicilico~~ ~~aspirina~~ può avere maggiori possibilità di sanguinamento.

(...)

3. Come prendere Eliquis

(...)

Dose

Deglutisca la compressa con un pò d'acqua. Eliquis può essere preso con o senza cibo.

~~Cerchi di prendere le compresse alla stessa ora ogni giorno, per ottenere il migliore effetto dal trattamento.~~

(...)

Istruzioni per la frantumazione della compressa

(...)

- Trasferire con attenzione tutta la polvere in un contenitore idoneo e poi miscelare la polvere con una piccola quantità, ad. es., 30 mL (2 cucchiaini da tavola), di acqua o di uno degli altri liquidi sopra menzionati per preparare una miscela.

(...)

- Risciacquare il pestello e il mortaio usati per frantumare la compressa ed il contenitore, con una piccola quantità di acqua (ad. es., 30 mL) o di uno degli altri liquidi, e deglutire il risciacquo.

Prenda Eliquis come raccomandato:

Per prevenire la formazione di coaguli di sangue nel cuore in pazienti con battito cardiaco irregolare e con almeno un fattore di rischio aggiuntivo.

(...)

La dose raccomandata è una compressa due volte al giorno, per esempio, una al mattino ed una alla sera. ~~Cerchi di prendere le compresse alla stessa ora ogni giorno, per ottenere il migliore effetto dal trattamento.~~ Il suo medico deciderà per quanto tempo dovrà continuare il trattamento.

Per trattare i coaguli di sangue nelle vene delle gambe e nei vasi sanguigni dei polmoni

(...)

Dopo 7 giorni la dose raccomandata è **una compressa** di Eliquis **5 mg** due volte al giorno, per esempio, una al mattino ed una alla sera. ~~Cerchi di prendere le compresse alla stessa ora ogni giorno, per ottenere il migliore effetto dal trattamento.~~

Per prevenire che i coaguli di sangue si riformino dopo il completamento dei 6 mesi di trattamento

La dose raccomandata è una compressa di Eliquis **2,5 mg** due volte al giorno, per esempio, una al mattino ed una alla sera. ~~Cerchi di prendere le compresse alla stessa ora ogni giorno, per ottenere il migliore effetto dal trattamento.~~

Il suo medico deciderà per quanto tempo dovrà continuare il trattamento.

(...)

6. Contenuto della confezione e altre informazioni

Cosa contiene Eliquis

- Il principio attivo è apixaban. Ogni compressa contiene 2,5 mg di apixaban.
- Gli eccipienti sono:
 - Nucleo della compressa: **lattosio anidro** (vedere paragrafo 2), cellulosa microcristallina, croscarmellosa sodica, sodio laurilsolfato, magnesio stearato (E470b).
 - Rivestimento: **lattosio monoidrato** (vedere paragrafo 2), ipromellosa (E464), titanio biossido (E171), triacetina, ossido di ferro giallo-rosso (E172)

SCHEDA DI ALLERTA PER IL PAZIENTE

Eliquis (apixaban)

Scheda di Allerta per il Paziente

(...)

Informazioni per i pazienti

- Prenda Eliquis regolarmente secondo le istruzioni. Se dimentica di prendere una dose, la prenda non appena se ne ricorda e poi continui a seguire il suo schema di somministrazione.
- Non interrompa l'assunzione di Eliquis senza parlarne prima con il suo medico, perché lei è a rischio di andare incontro ad un ictus o ad altre complicazioni.
- Eliquis aiuta a fluidificare il suo sangue. Tuttavia, questo può aumentare il rischio di sanguinamento.
- Segni e sintomi di sanguinamento includono lividi o sanguinamento sotto pelle, feci color catrame, sangue nelle urine, sangue dal naso, capogiri, stanchezza, pallore o debolezza, mal di testa improvviso grave, tosse con sangue o sangue nel vomito.
- In caso di sanguinamento che non si fermi da solo, **richieda immediatamente assistenza medica.**
- Se deve sottoporsi ad un intervento chirurgico, informi il medico che sta assumendo Eliquis.

Informazioni per gli operatori sanitari

- Eliquis (apixaban) è un anticoagulante orale che agisce attraverso un'inibizione diretta selettiva del fattore Xa.
- Eliquis può aumentare il rischio di sanguinamento. In caso di eventi di sanguinamento maggiore, Eliquis deve essere interrotto immediatamente.
- Il trattamento con Eliquis non richiede un monitoraggio di routine del livello di esposizione. Un dosaggio quantitativo calibrato del fattore anti-FXa può essere utile in circostanze eccezionali, come ad esempio, sovradosaggio e chirurgia d'urgenza (test di coagulazione quali, tempo di protrombina (PT), rapporto internazionale normalizzato (INR) e tempo di tromboplastina parziale attivata (aPTT) non sono raccomandati) - vedere RCP.

~~Questo medicinale è sottoposto a monitoraggio addizionale. Ai pazienti ed agli operatori sanitari è richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta tramite il sistema nazionale di segnalazione.~~