

Plavix compresse

Estratto del Foglio illustrativo: Informazioni per l'utente

Plavix 300 mg compresse rivestite con film clopidogrel

../..

Altri medicinali e Plavix

../..

Deve informare in modo preciso il medico se sta prendendo:

- medicinali che possono aumentare il suo rischio di sanguinamento come:
 - ✓ anticoagulanti orali, medicinali usati per ridurre la coagulazione del sangue,
 - ✓ un medicinale antinfiammatorio non steroideo, generalmente usato per trattare gli stati dolorosi e/o infiammatori di muscoli o articolazioni,
 - ✓ eparina o qualsiasi altro farmaco iniettabile usato per ridurre la coagulazione sanguigna,
 - ✓ ticlopidina, altri agenti antiplastrinici,
 - ✓ un inibitore selettivo della ricaptazione della serotonina (compreso ma non limitato a fluoxetina o fluvoxamina), medicinali di solito utilizzati per trattare la depressione,

~~../..~~

- ~~omeprazolo, o esomeprazolo o cimetidina~~, medicinali usati per trattare problemi di stomaco,
- ~~fluconazolo, o voriconazolo, ciprofloxacina, o cloramfenicolo~~, medicinali usati per trattare le infezioni ~~batteriche o~~ fungine,
- efavirenz, un medicinale usato per il trattamento dell'infezione da HIV (virus dell'immunodeficienza umana),

~~-----~~

- ~~carbamazepina, o oxcarbazepina, un medicinale~~ usato ~~i~~ per trattare alcune forme di epilessia,
- ~~ticlopidina, altri agenti antiplastrinici,~~
- ~~un inibitore selettivo della ricaptazione della serotonina (compreso ma non limitato a fluoxetina o fluvoxamina), medicinali di solito utilizzati per trattare la depressione,~~
- moclobemide, medicinale usato per trattare la depressione,
- ~~../..~~ repaglinide, un medicinale usato per trattare il diabete,
- paclitaxel, un medicinale usato per trattare il cancro.

../..

3. Come prendere Plavix

../...

La dose raccomandata, anche per i pazienti con diagnosi di "fibrillazione atriale" (un battito cardiaco irregolare), è una compressa di 75 mg di Plavix al giorno da prendere per via orale durante o lontano dai pasti, e alla stessa ora ogni giorno.

Se lei ha avuto un grave dolore al petto (angina instabile o attacco cardiaco), il medico può darle 300 mg di Plavix (1 compressa da 300 mg o 4 compresse da 75 mg) una volta all'inizio del trattamento. Successivamente, la dose raccomandata è una compressa di 75 mg di Plavix al giorno, ~~da prendere per via orale durante o lontano dai pasti, e alla stessa ora ogni giorno.~~ come descritto sopra.

../..

Effetti indesiderati rari (possono verificarsi fino a 1 paziente su 1000):
Vertigine, aumento di volume delle mammelle nei maschi.

../..

Produttori :

Sanofi Winthrop Industrie

1, Rue de la Vierge, Ambarès & Lagrave, F-33565 Carbon Blanc cedex, Francia

Plavix compresse

o

Sanofi-Synthelabo Limited,
Edgefield Avenue, Fawdon
Newcastle Upon Tyne, Tyne & Wear NE3 3TT, Regno Unito

o

[Delpharm Dijon](#) ~~Sanofi Winthrop Industrie~~
6, Boulevard de l'Europe, F-21800 Quétigny, Francia

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il ~~Gennaio 2014~~ [Dicembre 2015](#)

../..