

Estratto del Foglio illustrativo: Informazioni per l'utente

DuoPlavin 75 mg/100 mg compresse rivestite con film
clopidogrel/acido acetilsalicilico

../..

2. Cosa deve sapere prima di prendere DuoPlavin

- ../..

Avvertenze e precauzioni

In presenza di una delle situazioni menzionate qui sotto, informi il medico prima di prendere DuoPlavin:

- ../..
- [se beve alcool, a causa di un maggiore rischio di sanguinamento o lesione gastrointestinali](#)
- ../..

Altri medicinali e DuoPlavin

../..

Deve informare in modo particolare il medico se sta prendendo:

- [medicinali che possono aumentare il suo rischio di sanguinamento come:](#)
 - [anticoagulanti orali, medicinali usati per ridurre la coagulazione sanguigna,](#)
 - [ASA o un altro medicinale antinfiammatorio non steroideo, generalmente usato per trattare le condizioni dolorose e/o infiammatorie di muscoli o articolazioni,](#)
 - [eparina o qualsiasi altro medicinale iniettabile usato per ridurre la coagulazione sanguigna,](#)
 - [ticlopidina, altri antiaggreganti piastrinici,](#)
 - [un inibitore selettivo della ricaptazione della serotonina \(includendo, ma non solo, fluoxetina o fluvoxamina\), medicinali normalmente utilizzati per trattare la depressione,](#)
- omeprazolo o esomeprazolo ~~o cimetidina~~, medicinali usati per trattare problemi di stomaco,
- metotressato, un medicinale usato per trattare una malattia grave delle articolazioni (artrite reumatoide) o una malattia della pelle (psoriasi),
- [acetazolamide, un medicinale usato per trattare il glaucoma \(aumento della pressione oculare\) o epilessia o per aumentare il flusso di urina,](#)
- probenecid, benzbromarone o sulfpirazone, medicinali usati per trattare la gotta,
- fluconazolo o voriconazolo, ~~ciprofloxacina o cloramfenicolo~~, medicinali utilizzati per combattere infezioni ~~batteriche e micotiche~~ [fungine](#),
- [efavirenz, un medicinale usato per il trattamento dell'infezione da HIV \(virus dell'immunodeficienza umana\),](#)
- [acido valproico, valproato o carbamazepina,](#) ~~o oxcarbazepina un medicinale usato~~ [medicinali usati](#) per trattare alcune forme di epilessia,
 - ~~o ticlopidina, altri antiaggreganti piastrinici,~~
 - ~~o un inibitore selettivo della ricaptazione della serotonina (includendo, ma non solo, fluoxetina o fluvoxamina), medicinali normalmente utilizzati per trattare la depressione,~~
- [il vaccino contro la varicella, un medicinale usato per prevenire la varicella o l'herpes zoster, entro 6 settimane dall'assunzione di DuoPlavin, o se ha in corso un'infezione causata da varicella o herpes zoster \(vedere paragrafo 2 "Bambini e adolescenti"\),](#)
- [moclobemide, medicinale usato per trattare la depressione,](#)
- [repaglinide, un medicinale usato per trattare il diabete,](#)
- [paclitaxel, un medicinale usato per trattare il cancro.](#)

../..

4. Possibili effetti indesiderati

../..

Altri effetti indesiderati comprendono:

../..

DuoPlavin compresse rivestite con film

Effetti indesiderati rari (possono verificarsi fino a 1 paziente su 1000):

Vertigine, [aumento di volume delle mammelle nei maschi](#).

../..

Effetti indesiderati con frequenza non nota (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili):

Ulcera perforata, ronzio nelle orecchie, perdita dell'udito, reazioni allergiche improvvise con rischio per la vita [o reazioni di ipersensibilità compresi il dolore addominale o al torace](#), nefropatia, ipoglicemia, gotta (una condizione caratterizzata da dolori e gonfiori articolari causati da cristalli di acido urico), peggioramento delle allergie alimentari, e una particolare forma di anemia (basso numero di globuli rossi nel sangue) (vedere paragrafo 2 “Avvertenze e precauzioni”).

Inoltre, il medico può identificare alterazioni degli esami del sangue o delle urine.

../..

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il ~~Maggio~~ [Novembre](#) 2015