

Microser compresse 8 mg, 16 mg; 24 mg; 12,5 mg/ml gocce orali soluzione

## Foglio illustrativo: informazioni per il paziente

**MICROSER 8 mg compresse**  
**MICROSER 16 mg compresse**  
**MICROSER 24 mg compresse**  
**MICROSER 12,5 mg/mL gocce orali, soluzione**

Betaistina dicloridrato

### Avvertenze e precauzioni

Si rivolga al medico prima di prendere Microser se ha:

- ha l'asma
- ha avuto nel passato un'ulcera allo stomaco
- inala accidentalmente Microser gocce orali potrebbe, teoricamente, avere difficoltà a respirare (broncospasmo) ed una diminuzione della pressione del sangue
- ha un arrossamento della pelle con prurito, eruzione cutanea o febbre da fieno
- ha la pressione sanguigna bassa.
- è in stato di gravidanza o sta allattando (vedere "Gravidanza e allattamento")

### Anziani

Microser può essere usato alle dosi raccomandate al paragrafo 3. Come prendere MICROSER

### Altri medicinali e Microser

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale.

In particolare, informi il medico o il farmacista se sta assumendo uno qualsiasi dei seguenti medicinali:

- Non prenda antistaminici mentre è in trattamento con Microser che, in teoria, potrebbero ridurre l'effetto di Microser
- inibitori delle monoaminossidasi (usati per il trattamento della depressione) che potrebbero influenzare i livelli di Microser

L'uso di Microser gocce orali soluzione può dare un risultato positivo ai test sul livello di alcool nel sangue o nelle urine effettuato da alcune federazioni sportive.

### Microser con cibi e bevande

Prenda le compresse o le gocce orali soluzione insieme o dopo i pasti. Microser può causare lievi disturbi allo stomaco (elencati al paragrafo 4). L'assunzione di Microser durante i pasti può aiutare a ridurre tali disturbi.

### Gravidanza e allattamento

#### Gravidanza

Se è in corso una gravidanza, se sospetta o sta pianificando una gravidanza, o se sta allattando con latte materno chiedi consiglio al medico o al farmacista prima di prendere questo medicinale.

Non prenda Microser se è in stato di gravidanza a meno che il medico abbia deciso che sia necessario.

#### Allattamento

Non è noto se Microser passa nel latte materno. Non prenda Microser se sta allattando al seno a meno che il medico le dica di farlo.

### Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

Gli studi clinici dimostrano che Microser non altera sembra avere effetti sulla capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. Tuttavia tenga presente che la patologia per cui lei è in trattamento con Microser, le può causare sensazione di capogiro o di malessere.

### 3. Come prendere MICROSER

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista.

~~Prenda le compresse o le gocce orali soluzione insieme o dopo i pasti~~

La dose raccomandata è:

Microser 8 mg compresse: 2-4 compresse al giorno

Microser 16 mg compresse: 2-3 compresse al giorno

Microser 24 mg compresse: 1 compressa 2 volte al giorno

Microser gocce orali, soluzione (con dosatore): 1 erogazione (0,64 mL di soluzione, equivalenti a 8 mg di betaistina) diluita in acqua, 2-4 volte al giorno.

#### Se prende più Microser di quanto deve

Si rivolga al medico il più presto possibile o si rechi al più vicino ospedale. I sintomi di sovradosaggio sono nausea, sonnolenza, dolore addominale, mal di testa, capogiri, convulsioni, complicazioni polmonari e cardiache, battito cardiaco veloce, difficoltà a respirare o ritenzione di liquidi. Raramente il sovradosaggio può causare convulsioni.

### 4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Sono stati osservati i seguenti effetti indesiderati:

Comune (può interessare fino ad una persona su 10): mal di testa, nausea (sensazione di malessere), difficoltà della digestione (dispepsia)

*Raro* (può interessare meno di una persona su 1.000)

- Peggioramento di asma bronchiale preesistente, palpitazioni

*Frequenza non nota* (la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili)

- Capogiri
- ~~Mal di testa~~
- Senso anormale del tatto (disestesia)
- Tremore
- Respiro corto (dispnea)
- Sanguinamento nello stomaco (emorragia gastrointestinale)
- Mal di stomaco, gonfiore di stomaco, distensione dell'addome
- ~~Nausea (sensazione di malessere)~~ Vomito (stato di malessere)
- Aumento degli enzimi epatici (si rileva dagli esami del sangue)
- Eruzione cutanea, prurito o gonfiore (orticaria, prurito)
- Gonfiore (edema)
- Reazione di ipersensibilità (allergia).

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il: Giugno 2016