

Foglio illustrativo: informazioni per l'utilizzatore

CERVIDIL 1 mg ovuli

Gemeprost

Altri medicinali e CERVIDIL

Informi il medico o il farmacista se sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere qualsiasi altro medicinale, ~~compresi quelli ottenuti senza prescrizione medica.~~

Guida di veicoli e utilizzo di macchinari

Cervidil non altera o altera in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli ~~e~~ di usare macchinari.

3. Come usare CERVIDIL

Nella donna adulta, Cervidil viene utilizzato:

Segni e sintomi dell'effetto del medicinale (sanguinamento, contrazioni uterine) si verificano, nella maggior parte dei casi, subito dopo la somministrazione del primo o del secondo ovulo. Se l'utero non si è svuotato dopo l'introduzione di 5 ovuli, si può ripetere un ciclo simile [almeno 24 ore dall'inizio del ciclo precedente.](#)

[24 ore dopo l'ultima somministrazione.](#)

4. Possibili effetti indesiderati

- [Gli effetti indesiderati più comuni sono di modesta gravità: nausea, vomito, diarrea, rialzo termico.](#)
- [Gli effetti indesiderati di elevata gravità sono rappresentati da shock e infarto del miocardio \(eventi emersi da segnalazioni spontanee la cui frequenza non è nota\), sanguinamento uterino, rottura dell'utero e lacerazione del collo dell'utero \(effetti indesiderati rari\).](#)
- ~~La maggior parte degli effetti indesiderati è di modesta gravità: crampi dolorosi di tipo mestruale, accompagnati o meno da perdita di sangue tipo "spotting", nausea, vomito o diarrea.~~
- Effetti ~~da~~ molto comuni ([possono interessare più di un \$\geq 1\$ paziente su 10](#)) ~~a comuni (≥ 1 paziente su 100 ma < 1 paziente su 10):~~
 - Nausea, vomito, diarrea
 - Aumento della temperatura corporea
- Effetti ~~da~~ comuni (~~≥ 1 paziente su 100 ma~~ [possono interessare fino a \$< 1\$ paziente su 10](#)) ~~a non comuni (≥ 1 paziente su 1.000 ma < 1 paziente su 100):~~
 - Ipertensione o ipotensione arteriosa (pressione sanguigna elevata o bassa) con palpitazioni
 - Vertigini, cefalea (mal di testa)
 - Prurito, eruzioni cutanee (reazioni della pelle)
 - Lombalgia (dolore alla parte bassa della schiena)
 - Brividi, arrossamento del viso
 - Crampi dolorosi di tipo mestruale
- Effetti rari (~~≥ 1 paziente su 10.000 ma~~ [possono interessare fino a 1 paziente su 1.000](#)):
 - Vampate di calore
 - Sanguinamento uterino, rottura dell'utero, lacerazioni del collo dell'utero

- Effetti la cui frequenza non è nota ([la frequenza non può essere stabilita sulla base dei dati disponibili](#)):
 - Spasmi coronarici (contrazione improvvisa delle arterie del cuore) e infarto del miocardio, casi di shock
 - Irrequietezza

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista o all'infermiere.

~~Lei~~ **P**uò inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite l'Agenzia Italiana del Farmaco, sito web: www.agenziafarmaco.gov.it/it/responsabili.

Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

5. Come conservare CERVIDIL

~~Tenere~~ **Conservi** questo medicinale fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Non usi questo medicinale dopo la data di scadenza che è riportata sulla scatola [dopo Scad.](#)