

Vimpat

Foglio illustrativo: informazioni per il paziente

Vimpat 50 mg compresse rivestite con film
Vimpat 100 mg compresse rivestite con film
Vimpat 150 mg compresse rivestite con film
Vimpat 200 mg compresse rivestite con film

Lacosamide

Legga attentamente questo foglio prima di prendere questo medicinale perché contiene importanti informazioni per lei.

- Conservi questo foglio. Potrebbe aver bisogno di leggerlo di nuovo.
- Se ha qualsiasi dubbio, si rivolga al medico o al farmacista.
- Questo medicinale è stato prescritto soltanto per lei. Non lo dia ad altre persone, anche se i sintomi della malattia sono uguali ai suoi, perché potrebbe essere pericoloso.
- Se si manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Vedere paragrafo 4.

Contenuto di questo foglio:

1. [Che è Cos'è Vimpat](#) e a cosa serve
2. Cosa deve sapere prima di prendere Vimpat
3. Come prendere Vimpat
4. Possibili effetti indesiderati
5. Come conservare Vimpat
6. Contenuto della confezione e altre informazioni

1. [Che è Cos'è Vimpat](#) e a cosa serve

Lacosamide (Vimpat) è utilizzato per trattare una certa forma di epilessia (vedere sotto) in pazienti di età uguale o superiore ai 16 anni. [Vimpat è utilizzato in aggiunta ad altri medicinali antiepilettici.](#)

L'epilessia è una condizione in cui i pazienti hanno delle crisi ([convulsioni attacchi epilettici](#)) che si ripetono. Vimpat è utilizzato per quella forma di epilessia in cui le crisi coinvolgono inizialmente un solo lato del cervello, ma possono successivamente estendersi ad aree più ampie su entrambi i lati del cervello (crisi ad esordio parziale con o senza generalizzazione secondaria).

Vimpat le è stato prescritto dal medico per ridurre il numero delle crisi.

[Vimpat può essere utilizzato da solo o con altri medicinali antiepilettici.](#)

[...]

3. Come prendere Vimpat

Prenda questo medicinale seguendo sempre esattamente le istruzioni del medico o del farmacista. Se ha dubbi consulti il medico o il farmacista. La somministrazione di una dose di carico non è stata studiata in pazienti con stato epilettico.

Posologia

Prenda Vimpat due volte al giorno, una volta al mattino ed una volta alla sera, circa alla stessa ora ogni giorno. Vimpat è utilizzato come trattamento a lungo termine.

Quando prende Vimpat da solo:

[La dose iniziale di Vimpat è solitamente di 100 mg al giorno, da prendere in 2 dosi divise di 50 mg al mattino e 50 mg alla sera.](#)

[Il medico potrebbe anche prescrivere una dose iniziale di 200 mg di Vimpat al giorno, da prendere in 2 dosi divise di 100 mg al mattino e 100 mg alla sera.](#)

Vimpat

Il medico potrebbe aumentare la sua dose giornaliera di 100 mg ogni settimana, fino a raggiungere la cosiddetta dose di mantenimento, compresa fra 200 mg e 600 mg al giorno, da prendere in 2 dosi divise. Lei utilizzerà questa dose di mantenimento per il trattamento a lungo termine.

Quando prende Vimpat con altri medicinali antiepilettici:

La dose iniziale di Vimpat è solitamente di 100 mg al giorno, —da prendere in ~~due volte al giorno~~ 2 dosi divise di 50 mg al mattino e 50 mg alla sera. Il medico potrebbe aumentare la dose giornaliera di 100 mg ogni settimana, fino a raggiungere la cosiddetta dose di mantenimento, compresa fra 200 mg e 400 mg al giorno, presa in ~~due volte al giorno~~ 2 dosi divise. Lei utilizzerà questa dose di mantenimento per il trattamento a lungo termine.

Il medico potrebbe decidere di iniziare il trattamento con Vimpat con una singola dose di carico di 200 mg seguita, approssimativamente 12 ore più tardi, dall'inizio di un regime di dose di mantenimento. Una dose di carico deve essere somministrata sotto la supervisione del medico.

Il medico potrebbe ~~prescriverle~~ prescrivere una dose diversa se soffre di problemi ai reni.

Come assumere Vimpat in compresse

Deve ingoiare le compresse di Vimpat con una quantità sufficiente di acqua (es. un bicchiere). Può prendere Vimpat con o senza cibo.

Durata del trattamento con Vimpat

Vimpat è usato come trattamento a lungo termine. Deve continuare ad assumere Vimpat fino a quando il medico non le dirà di interrompere il trattamento.

Se prende più Vimpat di quanto deve

Contatti immediatamente il medico se ha assunto più Vimpat di quanto avrebbe dovuto.

Potrebbe avere capogiro, nausea, vomito, crisi o disturbi cardiaci.

Non provi a guidare.

Se dimentica di prendere Vimpat

Se ha dimenticato di prendere una dose di Vimpat, e sono passate poche ore dall'ora abituale di assunzione, prenda Vimpat appena se lo ricorda. Se è quasi ora di prendere la dose successiva (meno di 6 ore), non prenda la compressa dimenticata. Prenda la prossima compressa di Vimpat all'orario abituale. Non prenda una dose doppia per compensare la dimenticanza della dose.

Se interrompe il trattamento con Vimpat

Non interrompa il trattamento con Vimpat senza aver consultato il medico poiché i sintomi potrebbero ricomparire o peggiorare.

Se il medico decide di farle interrompere la terapia con Vimpat, le fornirà le istruzioni su come diminuire gradualmente la dose.

Se ha qualsiasi dubbio sull'uso di questo medicinale, si rivolga al medico o al farmacista.

4. Possibili effetti indesiderati

Come tutti i medicinali, questo medicinale può causare effetti indesiderati sebbene non tutte le persone li manifestino.

Gli effetti indesiderati a carico del sistema nervoso, come il capogiro, possono essere più frequenti dopo una dose di carico.

Molto comune: può interessare più di 1 ~~paziente~~ persona su 10

- Capogiro, mal di testa

Vimpat

- Nausea
- Visione doppia (diplopia)

Comune: può interessare ~~fino a 1 persona su da 1 a 10~~ [fino a 1 persona su da 1 a 10](#) ~~pazienti su 100~~ [pazienti su 100](#)

- Problemi nel mantenere l'equilibrio, difficoltà nel coordinare i movimenti, problemi di memoria, sonnolenza, tremori, difficoltà nel pensare o nel trovare le parole, movimenti rapidi ed incontrollati degli occhi (nistagmo), formicolio (parestesia)
- Vista offuscata
- Sensazione di "giramento" (vertigine)
- Vomito, stitichezza, eccesso di gas nello stomaco o nell'intestino, diarrea
- Prurito
- Cadute, contusione
- Stanchezza, difficoltà nel camminare, stanchezza inusuale e debolezza (astenia), sentirsi ubriaco
- Depressione
- Confusione
- Riduzione del tatto o della sensibilità, difficoltà nell'articolare le parole, disturbo dell'attenzione
- Rumori nell'orecchio come ronzii o fischi
- Indigestione, bocca secca
- Irritabilità
- Spasmi muscolari
- Eruzione cutanea
- Difficoltà nel dormire

Non comune: può interessare ~~fino a da 1 persona su a 10~~ [fino a da 1 persona su a 10](#) ~~pazienti su 100~~ [pazienti su 100](#)

- Riduzione della frequenza cardiaca
- Disturbo della conduzione cardiaca
- Sensazione esagerata di benessere
- Reazione allergica in seguito all'assunzione del medicinale
- Esami della funzionalità del fegato anormali
- Tentativo di suicidio
- Pensieri riguardanti il suicidio o autolesionistici
- Palpitazioni e/o pulsazioni rapide o irregolari
- Aggressività
- Agitazione
- Pensieri anormali e/o perdita del contatto con la realtà
- Reazione allergica grave che causa il rigonfiamento del volto, della gola, delle mani, dei piedi, delle caviglie o della parte bassa delle gambe
- Orticaria
- [Allucinazioni](#) (vedere e/o sentire cose che non sono reali)
- [Svenimento](#)

Non nota: la frequenza non può essere definita sulla base dei dati disponibili

- Grave diminuzione del numero di cellule di una specifica classe di globuli bianchi (agranulocitosi)
- Reazione cutanea grave che può includere sintomi simili all'influenza, un'eruzione cutanea del viso, eruzione cutanea estesa con febbre, aumento dei livelli degli enzimi epatici osservato negli esami del sangue e un incremento di un tipo di globuli bianchi (eosinofilia) e linfonodi ingrossati
- Un'eruzione cutanea estesa con vescicole e desquamazione della cute, in particolare intorno alla bocca, al naso, agli occhi ed ai genitali (sindrome di Stevens-Johnson) ed una forma più grave che causa desquamazione cutanea in più del 30% della superficie corporea (necrolisi

Vimpat

epidermica tossica).

Segnalazione degli effetti indesiderati

Se manifesta un qualsiasi effetto indesiderato, compresi quelli non elencati in questo foglio, si rivolga al medico o al farmacista. Lei può inoltre segnalare gli effetti indesiderati direttamente tramite il sistema nazionale di segnalazione riportato nell'[Allegato V](#). Segnalando gli effetti indesiderati lei può contribuire a fornire maggiori informazioni sulla sicurezza di questo medicinale.

Questo foglio illustrativo è stato aggiornato il [12/2016](#) ~~{mese/AAAA}~~

Altre fonti di informazioni

Informazioni più dettagliate su questo medicinale sono disponibili sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali: <http://www.ema.europa.eu>.